

- ६.५ वेळेवर पेरणी केलेल्या पिकास १५ दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ कोळपण्या देवून व खुरपणी करून शेत तणविरहीत ठेवा.
- ६.६ ऊन्हाळी भुईमूगास जमिनीच्या मगदूराप्रमाणे ८ ते १० दिवसांच्या अंतराने पाणी द्या.

७) ऊन्हाळी सूर्यफूल :

- ७.१ ऊन्हाळी सूर्यफूल पेरणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात पूर्ण करा.
- ७.२ एस.एस.-५६, भानू, मॉर्डन या सुधारीत जातीचा किंवा एल.डी.एम.आर.एस.एच. १ किंवा ३, एम.एस.एफ.एच. १७, के.बी.एस.एच. ४४ किंवा फुले रवीराज किंवा एम.एस.एफ.एच.-१७ या संकरित वाणाचा उपयोग करा.
- ७.३ मध्यम खोल जमिनीसाठी दोन ओळीतील अंतर ४५ सें.मी. × २२.५ सें.मी. तर भारी जमिनीसाठी ६० सें.मी. × ३० सें.मी. अंतरावर टोकण करावी.
- ७.४ पेरणीच्या वेळी पिकास हेक्टरी प्रत्येकी ३० किलो नत्र, स्फुरद, पालाश या रासायनिक खतांच्या मात्रा पेरताना द्या. ऊरलेला ३० किलो नत्र पेरणीनंतर ३० दिवसांनी पाण्याच्या पाळीपूर्वी द्यावे.
- ७.५ पेरणीनंतर १५-२० दिवसांनी भारी जमिनीत ३० सें.मी. व मध्यम हलक्या जमिनीत २२.५ सें.मी. अंतरावर एकच जोमदार रोप ठेवून विरळणी करा.
- ७.६ पिकावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, मॅन्कोझेब २५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून हेक्टरी ५०० लिटर पाणी या प्रमाणात फवारावे.
- ७.७ सूर्यफुलावरील केसाळ अळीच्या नियंत्रणासाठी निंबोळी अर्क (५ %) किंवा कडुनिंब आधारित कीडनाशक (अँझाडिरेक्टिन ५० हजार पीपीएम) १ मि.लि. प्रति लिटर अथवा डायमिथोएट (३० इ.सी.) २ मि.लि किंवा क्लिनॉलफॉस (२५ इ.सी) २ मिलि प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. किडीचे अंडीपुंज, अळ्या गोळा करून नाश करावा. कार्बारील भुकटी (१०%) २० किलो प्रती हेक्टरी या प्रमाणात धुळावी.

८) फळबाग :

- ८.१ नवीन लागवड केलेल्या आंबा कलमांचे व नारळ रोपांचे उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सावली करा.
- ८.२ नवीन लागवड केलेल्या कलमांना/रोपांना काठीचा आधार द्या व आलेला मोहोर आणि फुले काढून टाका.
- ८.३ नवीन फळबाग लागवडीमध्ये ज्या ठिकाणी पाण्याची टंचाई आहे. त्याठिकाणी पालापाचोळा आच्छादनाबरोबरच मडका सिंचन पध्दतीचा अवलंब करा.
- ८.४ पूर्ण वाढलेल्या नारळाच्या झाडांना नत्र खताचा तिसरा हप्ता (७५० ग्रॅम युरिया प्रती झाड) द्या.
- ८.५ काजूच्या झाडावर फळे धरताना ३ टक्के युरिया द्रावणाची फवारणी करा. (३० ग्रॅम प्रति लिटर पाणी)
- ८.६ काजूच्या बागेला फळ धारणेच्या वेळी संरक्षित पाणी द्या.
- ८.७ काजूच्या मोहोरावरील करपा/शेंडेमर रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास १२५० ग्रॅम डायथेन एम-४५ हे बुरशीनाशक ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. (२.५ ग्रॅम प्रति लिटर पाणी)
- ८.८ आंब्याच्या कलमावर फळ धारणा झाल्यानंतर लगेच एन.ए.ए. १५ पी.पी.एम. या संजिवकाची फवारणी करा. (१५ मिली ग्रॅम प्रति लिटर पाणी)