

- १.५ रांगडा हंगामातील कांदा काढणीस तयार झाला असल्यास तीन आठवडे आधी कांद्याचे पाणी बंद करावे.
- १.६ रबी हंगामातील कांदा पीक दोन महिन्यांचे झाले असलेस नत्र खताचा दुसरा हप्ता द्यावा व पीक तण मुक्त ठेवावे.
- १.७ वांगी व टोमॅटोची रोपे लावताना प्रति लिटर पाण्यात २० ग्रॅम ट्रायकोडर्मा मिसळून रोपांची मुळे त्यात १० मिनिटे बुडवून घ्या.
- १.८ वेलवर्गीय भाज्यामध्ये मादी फुलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी बी उगवून आल्यानंतर वेल २ व ४ पांनावर असताना (काकडी, दूधीभोपळा, तांबडा भोपळा यासाठी) १०० पीपीएम तीव्रतेचे एन.ए.ए. हे संजिवक फवारावे तसेच कर्लिंगडासाठी टीबा (२, ४, ५-ट्राय आयडो बेन्झाईक अॅसिड) हे संजिवक २५ ते ५० पीपीएम फवारावे (२५ ते ५० मिलीग्रॅम प्रति लिटर पाणी).
- १.९ वेलवर्गीय भाज्यावरील काळे, तांबडे भुंगेरे या किडीच्या नियंत्रणासाठी अॅसिफेट ७ ग्रॅम किंवा ईमिडाक्लोप्रिड ७ मिली वा कॉन्फिडॉर १० मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
- १.१० उन्हाळी टोमॅटो लागवडीसाठी रोपे तयार झाली असल्यास लागवड करावी.लागवडीच्या वेळी शिफारशीत रासायनिक खत मात्रेच्या ५० टक्के नत्र ,संपुर्ण स्फुरद व पालाश द्यावे.

१०) पशुविज्ञान व दूग्धशास्त्र :

- १०.१ आवश्यकतेनुसार रब्बी चारा पिकांना ८ ते १० दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे.
- १०.२ आफ्रिकन टॉल मका, सदाबहार चवळी, जॉईंट बाजरा, रुचिरा किंवा स्वीट सोरगम ज्वारी इत्यादी उन्हाळी हिरव्या चारा पिकांची टप्याटप्याने पेरणी करा.
- १०.३ कडबा, भाताचे पिंजर आणि विविध प्रकारचा भुस्सा यासारख्या वाळल्यालेल्या चान्यांचे आगीपासून संरक्षण करा.
- १०.४ उन्हाची तीव्रता वाढू लागल्याने, दुभत्या जनावरांचे उन्हापासून संरक्षण करा.
- १०.५ सर्वच जनावरांना स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी वेळचेवेळी मिळेल याची काळजी घ्या.
- १०.६ जनावरांचे अंगावरील तसेच गोठ्यातील कृमीपासून संरक्षण करण्यासाठी वरचेवर १२.५% डेल्टामिथ्रीत औषधाचा गोठ्यामध्ये फवारणीसाठी उपयोग करा.

११. चारापिकांचे नियोजन असे करा :

चारापिके	पेरणीची वेळ	सुधारित वाण
ज्वारी	फेब्रुवारी - मार्च	रुचिरा, फुले, अमृता, मालदांडी ३५-१, पुसा चारी
मका	फेब्रुवारी - मार्च	आफ्रिकन टॉल, मांजरी कंपोझीट, विजय, गंगा सफेद -२
बाजरी	फेब्रुवारी - मार्च	जायंट बाजरा, बायफ बाजरा



विस्तार कृषि विदयावेत्ता,
विभागीय विस्तार केंद्र, कृ.म.कोल्हापूर



जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,
कोल्हापूर